

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang berjudul ”Pengaruh Terapi Musik Klasik Mozart Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi ORIF (*Open Reduction Internal Fixation*) di RSUD Mardi Waluyo Blitar” yang dilaksanakan pada Mei-Juni 2017 dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebelum diberikan terapi musik klasik Mozart, rata-rata intensitas nyeri dengan responden yang berjumlah 15 responden adalah 5,27 (nyeri sedang).
2. Setelah diberikan terapi musik klasik Mozart, rata-rata intensitas nyeri terjadi penurunan menjadi 2,73 (nyeri ringan).
3. Berdasarkan hasil uji statistic *paired t-test* terdapat perbedaan yang bermakna antara intensitas nyeri sebelum dengan setelah dilakukan terapi musik klasik Mozart pada pasien post operasi ORIF dengan nilai *p-value* sebesar 0,000. Terapi musik klasik Mozart berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri pasien post operasi ORIF.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian Pengaruh Terapi Musik Klasik Mozart Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi ORIF (*Open Reduction Internal*

Fixation) di RSUD Mardi Waluyo Blitar diatas peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

#### **5.2.1. Bagi Institusi Rumah Sakit**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi perawat khususnya perawat di ruang bedah untuk mengajarkan kepada pasien tentang penanganan nyeri nonfarmakologi yaitu terapi musik klasik mozart.

#### **5.2.2. Bagi Institusi Pendidikan**

Diharapkan pihak institusi pendidikan menambahkan referensi melalui pengadaan buku-buku penunjang tentang penatalaksanaan penanganan nyeri non farmakologi yang dilakukan pada pasien post operasi ORIF.

#### **5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan mengambil subjek yang berbeda serta menggunakan desain penelitian yang disertai dengan kelompok kontrol.