

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebanyak 13 responden (86,7%) adalah usia dewasa (25-59 th) dan 2 responden (13,3%) usia lanjut (62 th). Dengan diagnosa kistoma ovari suspek ganas 8 responden (53,3%) dan dengan diagnosa kistoma ovari 7 responden (46,7%) dan dengan tindakan medis laparatomi sebanyak 13 responden (86,7%) dan dengan tindakan laparaskopi 2 responden (13,3%)
2. Responden dengan status gizi kurang 10 responden (67,7%), dengan status gizi baik 2 responden (13,3%) serta status gizi lebih 3 responden (20%)
3. Responden dengan kadar HB > 10 g/dl sebanyak 11 responden (73,3%) dan responden dengan kadar HB < 10 g/dl sebanyak 4 responden (26,7%)
4. Dengan penyembuhan luka baik 10 responden (66,7%) dan dengan luka tidak baik sebanyak 5 responden (33,3%)
5. Dengan lama rawat inap pendek 9 responden (60%) dan dengan lama rawat inap panjang 6 responden (40%)
6. Ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan proses penyembuhan luka operasi ($p=0,031$)
7. Tidak ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan lama rawat inap ($p=0,128$)
8. Ada hubungan yang bermakna antara kadar hemoglobin dengan penyembuhan luka post operasi ($p=0,039$)
9. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kadar hemoglobin dengan lama rawat inap ($p=0,634$)

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kadar hemoglobin sebelum dan sesudah post operasi dengan jumlah sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang berbeda, hal ini disebabkan keterbatasan dalam pemberian intervensi serta monitoring dan evaluasi setelah post operasi