

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam kajian studi literatur pada 14 artikel ditemukan 6 faktor yang melatarbelakangi terjadinya *drop out* kontrasepsi yaitu :

5.1.1. Karakteristik umur yang digunakan dalam studi literatur ini adalah usia 15-49 tahun. Serta wanita yang lebih muda (<20-25 tahun) lebih cenderung mudah untuk berhenti memakai kontrasepsi

5.1.2. Paritas menjadi salah satu latarbelakang terjadinya *drop out* kontrasepsi, yaitu wanita nulipara lebih cenderung mudah untuk berhenti memakai kontrasepsi..

5.1.3. Dukungan suami menjadi salah satu latarbelakang terjadinya *drop out* kontrasepsi, yaitu wanita dengan dukungan pasangan rendah lebih cenderung mudah untuk berhenti memakai kontrasepsi.

5.1.4. Efek samping menjadi salah satu latarbelakang terjadinya *drop out* kontrasepsi, yaitu wanita yang mengalami efek samping selama pemakaian kontrasepsi lebih cenderung mudah untuk berhenti memakai kontrasepsi.

5.1.5. Kegagalan metode menjadi salah satu latarbelakang terjadinya *drop out* kontrasepsi.

5.1.6. Masih belum bisa ditarik kesimpulan secara tegas tentang apakah kualitas pelayanan melatarbelakangi kejadian *drop out* kontrasepsi. Terdapat kesenjangan, satu artikel mengatakan bahwa semakin mengikuti kegiatan penyuluhan semakin kecil kemungkinan *drop out*

kontrasepsi, dan satu artikel mengatakan semakin wanita mengikuti kegiatan penyuluhan maka semakin besar tingkat drop out kontrasepsi.

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara langsung (data primer) atau melakukan studi literatur dengan menambah faktor yang melatarbelakangi terjadinya *drop out* kontrasepsi. Serta lebih memperluas pencarian perihal kualitas pelayanan apakah menjadi latar belakang terjadinya *drop out* kontrasepsi.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Menjadikan hasil Studi Literatur ini sumber rujukan dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di wahana praktik khususnya topik *Family Planning* dan *Birth Planning* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *drop out* kontrasepsi.

5.1.3. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan/ dasar ilmiah, yang bisa digunakan oleh bidan dalam memaksimalkan pelayanan kontrasepsi dan dengan semaksimal mungkin untuk menurunkan angka *drop out* kontrasepsi.