

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Ibu yang memberikan Makanan Pendamping ASI dengan tepat kepada bayi usia 6-9 bulan adalah sebanyak 12 orang (32,2%) dan yang tidak tepat dalam pemberian MP-ASI sebanyak 19 orang (61,3%)
- b. Perkembangan normal pada bayi usia 6-9 bulan di Posyandu Desa Trayang adalah 20 orang (64,5%) dan perkembangan bayi abnormal sebanyak 11 orang (35,5%)
- c. Tidak terdapat hubungan antara Ketepatan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan Perkembangan Bayi Usia 6-9 Bulan.

#### **5.2 SARAN**

##### **5.2.1 Bagi Peneliti**

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan anak seperti faktor lingkungan sosial dan biologi.

### **5.2.2 Bagi Insitusi Pendidikan**

Institusi pendidikan diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut pada adanya hubungan ketepatan Pemberian MP ASI dengan Perkembangan Bayi Usia 6-9 Bulan

### **5.2.3 Bagi Tempat Penelitian**

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam memberikan penyuluhan gizi seimbang dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada bayi.

### **5.2.4 Bagi Pembaca**

Pembaca khususnya ibu hamil atau ibu yang memiliki balita hendaknya lebih memperhatikan dalam ketepatan pemberian MP ASI seperti waktu, jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi agar tercapai gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

## **5.3 REKOMENDASI**

Dikarenakan keterbatasan peneliti dalam memakai pedoman kuesioner yang digunakan dalam penelitian maka diharapkan akan ada peneliti lain yang akan:

- Meneliti kembali faktor-faktor lain yang dapat melatarbelakangi kejadian perkembangan pada bayi dan balita.
- Jumlah sampel diambil dari fasilitas kesehatan yang lain dengan jumlah sampel yang lebih besar.