

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hubungan derajat merokok dengan *Aldrete score* pada pasien *post general* anestesi di RSUD Karsa Husada Batu dijabarkan sebagai berikut.

1. Pasien *post* operasi menggunakan anestesi umum hampir setengahnya termasuk kategori perokok berat.
2. *Aldrete score* pasien *post* operasi dengan anestesi umum hampir setengahnya kurang stabil pada menit ke 60.
3. Ada hubungan antara derajat merokok dengan *Aldrete score* pada pasien *post general* anestesi. Kekuatan korelasi antara derajat merokok dengan *Aldrete score* pada pasien *post general* anestesi yaitu korelasi kuat dengan arah korelasi negatif yang artinya berlawanan dimana semakin tinggi derajat merokok maka semakin rendah atau menurunnya *Aldrete score*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat diambil saran sebagai berikut.

1. Rumah sakit

Kepada tenaga kesehatan diharapkan memperhatikan mengenai riwayat merokok pada pasien yang akan menjalani operasi dengan anestesi umum dan memperhatikan pemantauan pada fase pulih sadar pasien yang telah menjalani operasi dengan anestesi umum

2. Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai hubungan derajat merokok dengan Aldrete score pada pasien *post general* anestesi dalam bidang keperawatan perioperatif.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi fase pulih sadar pada pasien perokok yang telah menjalani operasi menggunakan general anestesi.