

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan MAP dengan Protein Urin sebagai Skrining Preeklampsia pada Ibu Hamil di Puskesmas Mulyorejo Kota Malang pada tanggal 25 Mei – 19 Juni 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sebagian besar responden memiliki MAP negatif
2. Hampir seluruh responden memiliki protein urine negatif
3. Adanya hubungan yang signifikan antara MAP dengan protein urine sebagai skrining preeklampsia dengan tingkat kekuatan korelasi cukup kuat dan arah korelasi positif yang berarti jika MAP positif maka protein urine akan positif.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Ibu Hamil

Dianjurkan kepada ibu hamil agar rutin melakukan pemeriksaan ANC untuk skrining preeklampsia yaitu dengan memeriksa MAP dan protein urine.

5.2.2 Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan semua bidan untuk melakukan skrining preeklampsia.

5.2.3 Bagi Institusi Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar mengembangkan variabel lain yang berhubungan dengan preeklampsia seperti IMT atau ROT.